

お詫びと訂正

2015年7月に掲載したENIF D-pro 限定記事「一覧表 インフルエンザ HA ワクチン (2015~2016年)」の内容のうち、以下の商品の「添加物 (1mL 中)」の含量に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

商品名	誤							正						
	チメロサル	ホルマリン	塩化ナトリウム	リン酸水素ナトリウム水和物	リン酸二水素カリウム	リン酸二水素ナトリウム	ポリソルベート80	チメロサル	ホルマリン	塩化ナトリウム	リン酸水素ナトリウム水和物	リン酸二水素カリウム	リン酸二水素ナトリウム	ポリソルベート80
	(mg)	(μL)	(mg)	(mg)	(mg)	(mg)	(μL)	(mg)	(μL)	(mg)	(mg)	(mg)	(mg)	(μL)
フルービック HA			4.25	1.765		0.27				8.5	3.53		0.54	
インフルエンザ HA ワクチン 「北里第一三共」シリンジ 0.25mL		0.03 以下	2.08 以下	0.63	0.1		0.03 以下		0.12 以下	8.32 以下	2.52	0.4		0.12 以下
インフルエンザ HA ワクチン 「北里第一三共」シリンジ 0.5mL		0.05 以下	4.15 以下	1.255	0.204		0.05 以下		0.1 以下	8.3 以下	2.51	0.408		0.1 以下
フルービック HA シリンジ			4.25	1.765		0.27				8.5	3.53		0.54	

インフルエンザHAワクチン (2015~2016年)

商品名	会社名	剤形	包装	有効成分 (製造株)	添加物(1mL中)						
					チメロサル (mg)	ホルマリン (μL)	塩化ナトリウム (mg)	リン酸水素ナトリウム水和物 (mg)	リン酸二水素カリウム (mg)	リン酸二水素ナトリウム (mg)	ポリソルベート80 (μL)
インフルエンザHAワクチン 「化血研」	化血研= アステラス= 第一三共= 武田	バイアル	1mL1 瓶×2		0.005	0.1mg 以下*1	8.1	2.5	0.4		
インフルエンザHAワクチン 「北里第一三共」1mL	北里第一三共 ワクチン= 第一三共= 北里薬品		1mL1 瓶×2		0.005	0.1 以下	8.3 以下	2.51	0.408		0.1 以下
インフルエンザHAワクチン 「生研」	デンカ生研= アステラス= 武田		1mL1 瓶×1	A/カリフォルニア /7/2009(H1N1) pdm09 株	0.004	0.026 mg 以下*1	8.5	1.725	0.25		
「ビケンHA」	阪大微研= 田辺三菱= MSD		1mL1 瓶×2	A/スイス /9715293/2013 (H3N2) 株	0.008		8.5	3.53		0.54	
フルービック HA			0.5mL1 瓶×2	B/プーケット /3073/2013 (山形系統) 株			8.5	3.53		0.54	
インフルエンザHAワクチン 「北里第一三共」シリンジ 0.25mL	北里第一三共 ワクチン= 第一三共= 北里薬品	シリンジ	0.25mL1 筒×1 (注射針無し)	B/テキサス/2 /2013(ピクトリア 系統) 株		0.12 以下	8.32 以下	2.52	0.4		0.12 以下
インフルエンザHAワクチン 「北里第一三共」シリンジ 0.5mL			0.5mL1 筒×5 (注射針無し)			0.1 以下	8.3 以下	2.51	0.408		0.1 以下
フルービック HA シリンジ			0.5mL1 筒×2 (27G 注射針付き)					8.5	3.53		0.54

*1:ホルムアルデヒド換算の分量[mg](ホルマリンとしての分量[μL])は非公開

効能・効果	接種対象者	接種方法					有効期間 (検定合格日から)	貯法		
		定期接種	任意接種 ☉:望ましい							
インフルエンザの予防	・65歳以上の者 ・60~65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者	1回 0.5mL、 毎年度1回、 皮下注	年齢	1回接種量	接種回数	接種間隔	投与経路	1年		
			6ヵ月~3歳未満	0.25mL	2回	2~4週間 (4週間☉)	皮下注			
			3~13歳未満	0.5mL						
		13歳以上	0.5mL	1~2回	1~4週間 (4週間☉)	1年				
		_ *2	年齢	1回接種量	接種回数		接種間隔	投与経路	15ヵ月 (製造日から)	
										6ヵ月~3歳未満
3~13歳未満	0.5mL									
13歳以上	0.5mL	1~2回	1~4週間 (4週間☉)	1年						
1回 0.5mL、 毎年度1回、 皮下注	年齢	1回接種量	接種回数		接種間隔	投与経路	15ヵ月 (製造日から)			
								3~13歳未満	0.5mL	2回
				13歳以上				0.5mL	1~2回	
1回 0.5mL、 毎年度1回、 皮下注	年齢	1回接種量	接種回数	接種間隔	投与経路	1年				
							3~13歳未満	0.5mL	2回	2~4週間 (4週間☉)
							13歳以上	0.5mL		

*2:0.25mL 製剤のため、定期接種には使用できない

詳細は添付文書等をご参照ください。 2015.7 作成 2015.9 更新

遮光して、10℃以下に凍結を避けて保存